

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE RHYSSEMUS
DE MADAGASCAR
[COL. SCARABÆIDÆ, APHODIINI],

PAR M. G. BÉNARD.

Rhyssemus granulicollis nov. sp.

Insecte de forme allongée, parallèle à convexité bien marquée; d'un noir profond, à sculptures brillantes avec les bords de l'épistome, la région antérieure des angles du pronotum et les pattes rougeâtres. Surface de la tête chargée d'une granulation très dense et assez régulière; le front est orné de deux bourrelets arqués obliquement et la région antérieure de l'épistome presque lisse, ce dernier largement échancré en avant et à angles obtusément arrondis.

Côtés et base du pronotum ciliés de soies testacées et légèrement clavi-formes; angles antérieurs proéminents, angles postérieurs largement arrondis; sculpture très marquée : 1° sur le bord antérieur une ligne feutrée d'un jaune testacé; 2° une large bande garnie de granulations très denses et brillantes atteignant de chaque côté la région des angles antérieurs; 3° un intervalle étroit et à fond mat; 4° une ligne de gros granules régulièrement espacés; 5° un intervalle de même nature que le précédent; 6° un bourrelet étroit, déprimé au milieu; 7° un intervalle assez large garni d'une ligne de gros granules régulièrement espacés; 8° un bourrelet de même nature que le précédent; 9° un large espace, présentant transversalement trois lignes de gros granules séparées au milieu par un intervalle très étroit et à fond mat. Toutes ces sculptures n'atteignent pas le bord latéral du pronotum et, de chaque côté, se terminent en convergeant vers une série de fines granulations.

Écusson en triangle allongé. Élytres convexes, à côtes très accentuées, brillantes, minces et tranchantes, garnies de chaque côté et longitudinalement d'une ligne de fins granules régulièrement espacés. Stries larges, profondes et à fond mat. Épine humérale très courte, à peine visible.

Losange métasternal brillant, garni dans sa partie antérieure de quelques grosses verrucosités, présentant en son milieu une large dépression longitudinale avec un sillon médian fin et profond.

Arceaux de l'abdomen larges, brillants et fortement crénelés à leur bord antérieur.

Pattes d'un brun roux. Tibias antérieurs fortement tridentés, tibias intermédiaires et postérieurs très carénés et présentant de fines épines. Premier article des tarsi antérieurs aussi long que les deux suivants réunis. Premier article des tarsi intermédiaires et postérieurs aussi long que les trois suivants réunis.

Longueur, 4 millimètres.

Madagascar; Diégo-Suarez, Charles Alluaud 1893.

Par sa sculpture particulière, cet insecte ne ressemble à aucune des espèces déjà décrites.